

Balsamol Blattdünger 250 ml

zur Düngung und sofortigen Kräftigung von Immergrünen und anderen Pflanzen

Artikelnr.: 00858

GTIN: 4005240008584

Produkteigenschaften

Organischer Blattdünger mit vitalisierender Wirkung

- zur Kräftigung und Wiederbelebung von Immergrünen, Koniferen und Zierpflanzen, die durch Umweltbelastungen, Frost, Trockenheit, Umpflanzung oder schlechte Standortbedingungen geschädigt sind
- bewirkt deutliche Qualitäts- und Ertragssteigerungen bei Erdbeeren, Reben, Obstbäumen, Himbeeren, Tomaten, Rosen, Kohl, Kartoffeln, Salat und anderen Kulturen
- enthält als Wirkstoffe natürliche Aminosäuren und Peptide

Wirkstoff:

Organischer N-Dünger 9, flüssig hergestellt unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten

9,0 % Gesamtstickstoff (N)

Ausgangsstoffe: Tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 3 nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: hydrolysierte Proteine)

Nebenbestandteile: 0,8 % Natrium (Na), 50,0 % organische Substanz, chloridarm

Anwendungsgebiete:

Zur Anwendung im Haus- und Kleingarten.

Anwendungszeitraum:

Februar-Oktober

Gebrauch:

Vor Gebrauch schütteln! Messbecherverschluss abschrauben. Das oberste Ende des Spritzverschlusses mit einem Messer abschneiden. Dosierung im Messbecher vornehmen. Wirkungsdauer der Nährstoffe: ca. 3 Wochen.

Immergrüne und Koniferen: Balsamol Blattdünger mehrmals 0,3-1 %ig, d.h. 15-50 ml auf 5 Liter Wasser, spritzen. Kann ganzjährig gespritzt oder auch gegossen werden. Besonders bewährt hat sich die Anwendung im Frühjahr (März-Mai) an den ersten warmen Tagen bei Vegetationsbeginn. Bei stark geschädigten Bäumen weitere Behandlungen im Abstand von ca. 6-8 Wochen vornehmen. Je nach Zustand der Pflanzen 0,3-1 %ig spritzen, d.h. 15-50 ml Balsamol Blattdünger in 5 Liter Wasser.

Gemüse und Salat: Ca.1 Woche nach der Pflanzung, 0,2 %ig und ca. 3 Wochen nach der Pflanzung 0,3 %ig spritzen.

Erdbeeren: 10-14 Tage nach der Pflanzung im Spätsommer, 0,5 %ig spritzen. Weiterhin ca. 1 Woche vor der Blüte 0,3 %ig, bei Blühbeginn 0,5-1 %ig und bei Vollblüte 0,5 %ig spritzen.

Kern-, Stein- und Beerenobst: Bei Vegetationsbeginn 0,3 %ig spritzen. Weiterhin ca.1 Woche vor der Blüte 0,5 %ig, während der Blüte 0,3 %ig und nach der Ernte 0,5 %ig spritzen.

Zierpflanzen: Von März-Mai mit einer 0,3 %igen Lösung spritzen. Eventuell 1-2 mal wiederholen.

Weitere Hinweise:

Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor.

Wirkungsdauer der Nährstoffe:

ca. 3 Wochen

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Bei Beschwerden nach Einatmen ärztlicher Behandlung zuführen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei auftretenden Beschwerden nach Verschlucken Arzt aufsuchen.

Entsorgung:

Nur vollständig entleerte Packungen gehören in die Wertstoffsammlung.

Lagerung:

Für Kinder und Haustiere unerreikbaar lagern. Keine Mischung mit Futtermitteln.

Zusatzinformation:

-